



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌଷମ ସେବା
ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କେନ୍ଦ୍ର
ମହେଷାପାଟଣା, ଢେଙ୍କାନାଳ- ୭୫୯ ୦୦୧



ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା . ୨୪

ବୁଲେଟିନ ନମ୍ବର : ୧୭୮
ତାରିଖ : ୧୧/୦୬/୨୦୧୯
(ମଙ୍ଗଳବାର)

ଡ. ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ଅଲିମ

ଚେକନିକାଳ ଅଧିକାରୀ

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା

ଗତ ସପ୍ତାହ ର ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା (୦୫.୦୬.୨୦୧୯ ରୁ ୧୧.୦୬.୨୦୧୯)

ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	16.1
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍)	36.0-39.4
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍)	24.2-28.4

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରାମ ସୂଚନା

ତାରିଖ	ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	ତାପମାତ୍ରା (ଡି.ସେ.)		ସର୍ବମୋଟ ମେଘାଚ୍ଛାନ୍ଦତା (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)		ପବନ ର ବେଗ (କି.ମି./ଘ.)	ପବନ ର ଦିଗ
		ସର୍ବାଧିକ	ସର୍ବନିମ୍ନ		ସର୍ବାଧିକ	ସର୍ବନିମ୍ନ		
12/6/2019	0	40	26	3	54	17	7	263
13/6/2019	0	41	25	3	43	16	9	240
14/6/2019	4	40	25	4	64	21	13	255
15/6/2019	3	39	25	4	47	18	9	236
16/6/2019	0	39	26	4	48	24	10	237

- ➔ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନରେ ୬ ମି.ମି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
- ➔ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ । ସହିତ ୭-୧୩ କି.ମି.ପ୍ର.ଘ ବେଗରେ ପବନ ବୋହିପରେ ।
- ➔ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ବିବରଣୀ ବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ମାଟି ରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ➔ କୀଟନାଶକ ସିଂଚନକୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।

ଚିନାବାଦାମ : ଗତ ସପ୍ତାହର ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ସାଂବାଲୁଆ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ,ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ମତେ ପଦକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ

- ➔ ପ୍ରାୟ ମାଛିର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫେରୋମୋନ ଗ୍ରାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
- ➔ ଚଢ଼େଇ ବସିବା ପାଇଁ ଫସଲ ମଝିରେ ଝଟା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
- ➔ ସାଂବାଲୁଆ ଦେଖାଗଲେ ବିଷ ବଟିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଯଥା : ୧ କି.ଗ୍ରା କୁଣ୍ଡା ସହିତ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଓ ୨୦-୨୫ ଗ୍ରାମ କରଟପ ହାଇଡ୍ରୋ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଔଷଧ ଏବେଂ ପାଣିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜମି ମଝିରେ ୨୦-୨୫ ଜାଗାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଫଳ ମିଳେ ।

ପନିପରିବା: ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାଇଗଣ ଚାଷରେ **ଝାଉଁଳା ରୋଗ**ର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2.5 g copper oxychloride ସହିତ 1 g Plantomycin ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣ ରେ **ଫଳବିକ୍ଷା** ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଝାଉଁଳି ପତ୍ରଥୁବା ଅଗ ଡାକ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମେ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦ ମି . ଲି. ନିମ୍ନ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପଛା ୬୦ ମି . ଲି . ସିନୋସାଡ଼ ଓ ୩୦୦ ମି . ଲି . ଥିଓଡ଼ିକାର୍ବ ଔଷଧ କୁ ଅଦଳବଦଳ କରି ଏକର ପଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ପନିପରିବା ଫସଲରେ **ଜଉ ପୋକ ଓ ଧଳା ମାଛି ଶୋଷକ କୀଟ** ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ମି. ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଖରାଟିଆ ମୁଗ :

- ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟରେ ଅନିୟମିତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ଖରାଟିଆ ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛିର ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ସାହେବି ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
- ଧଳା ମାଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦-୧୫ ଟି ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଯନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗରେ ଖରାଟିଆ ମୁଗ ଫସଲରେ ଛୁଇଁ ବିକ୍ଷା ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି ପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ ୨୦୦ ଲିଟର ଜଳରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଥିଓଡ଼ିକାର୍ବ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ସମ୍ପଦ :

- ଦିନରେ ଅଧିକ ଗରମ ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଗରମ ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦେହର ଉଷ୍ମତା କମ କରିବା ପାଇଁ ଦେହରେ ପାଣି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

କୃଷି ଭୀତିକ କୌଶଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ୧୮୦୦ ୧୮୦ ୧୫୫୧ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ।