



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌଷମ ସେବା  
ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କେନ୍ଦ୍ର  
ମହିଷାପାଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ- ୭୫୯ ୦୦୧



ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା . ୧୫

ଡ. ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ଅଲିମ  
ଟେକନିକାଲ ଅଫିସର

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା

ବୁଲେଟିନ ନମ୍ବର : ୧୧୮  
ତାରିଖ : ୧୨/୦୪/୨୦୧୯  
(ଶୁକ୍ରବାର)

ଗତ ସପ୍ତାହ ର ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା (୦୭.୦୪.୨୦୧୯ ରୁ ୧୨.୦୪.୨୦୧୯)

ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	10
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍)	34.0-40.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍)	22.0-26.0

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରାମ ସୂଚନା

ତାରିଖ	ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	ତାପମାତ୍ରା (ଡି.ସେ.)		ସର୍ବମୋଟ ମେଘାଚ୍ଛାଙ୍କତା (ଅଙ୍ଗ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)		ପବନ ର ବେଗ (କି.ମି./ଘ.)	ପବନ ର ଦିଗ
		ସର୍ବାଧିକ	ସର୍ବନିମ୍ନ		ସର୍ବାଧିକ	ସର୍ବନିମ୍ନ		
14/4/2019	1	38	22	1	63	26	4	162
15/4/2019	0	38	23	2	63	20	7	195
16/4/2019	3	39	24	2	59	21	8	185
17/4/2019	0	38	23	1	59	21	8	196
18/4/2019	1	36	24	3	60	21	9	225

- ➔ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର, ସୋମବାର ଓ ବୁଧବାର ଦିନ ୫ ମି.ମି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
- ➔ ଆକାଶ ସମାନ୍ୟ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ୪-୯ କି.ମି.ପ୍ର.ଘ ବେଗରେ ପବନ ବୋହିପରେ ।
- ➔ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ବିବରଣୀ ବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ମାଟି ରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ➔ ଯଦି ଦରକାର ନଥାଏ ଜଳସେଚନକୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।
- ➔ କୀଟନାଶକ ସହିତ ଅଠା ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ

**ଚିନାବାଦାନ :** ଗତ ସପ୍ତାହର ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ଚିନାବାଦାନ ଫସଲରେ ସାଂବାଲୁଆ ର ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି , ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ମତେ ପଦକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ ।

- ➔ ପ୍ରାପ୍ତ ମାଛିର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫେରୋମୋନ ଗ୍ରାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
- ➔ ଚଢ଼େଇ ବସିବା ପାଇଁ ଫସଲ ମଝିରେ ଝଟା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
- ➔ ସାଂବାଲୁଆ ଦେଖାଗଲେ ବିଷ ବଟିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଯଥା : ୧ କି.ଗ୍ରା କୁଣ୍ଡା ସହିତ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଓ ୨୦-୨୫ ଗ୍ରାମ କରଟପ ହାଲଡ୍ରୋ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଔଷଧ ଏବେଂ ପାଣିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜମି ମଝିରେ ୨୦-୨୫ ଜାଗାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଫଳ ମିଳେ ।

**ପନିପରିବା:** ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାଇଗଣ ଚାଷରେ **ଝାଉଁଳା ରୋଗ**ର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2.5 g copper oxychloride ସହିତ 1 g Plantomycin ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣ ରେ **ଫଳବିକ୍ଷା** ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଝାଉଁଳି ପତ୍ରଥୁବା ଅଗ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମେ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦ ମି . ଲି. ନିମ୍ନ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପିଛା ୬୦ ମି . ଲି . ସ୍ପିନୋସାଡ଼ ଓ ୩୦୦ ମି . ଲି . ଥିଓଡ଼ିକାର୍ବ ଔଷଧ କୁ ଅଦଳବଦଳ କରି ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ପନିପରିବା ଫସଲରେ **ଜଉ ପୋକ ଓ ଧଳା ମାଛି ଶୋଷକ କୀଟ** ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ମି. ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ଖରାଟିଆ ମୂଗ :**

- ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ବିହନ ବୁଣାବୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
- ଶେଷ ଓତ ଚାଷ ସମୟରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧ ଟନ ଶଙ୍ଖା ଗୋବର ଖତ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିରେ ୫ ମି. ଲି . ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ ୬୦୦ ଏଫ. ଏସ. ଗୋଳାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫ କି. ଗ୍ରା. ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଧାତି କୁ ଧାତି ୩୦ ସେ . ମି . ଓ ଗଛ କୁ ଗଛ ୧୦ ସେ . ମି . ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ ।
- ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ସମୟରେ ଏକର ପିଛା ୩୫ କି . ଗ୍ରା . ତି ଏ ପି , ୪ କି . ଗ୍ରା . ୟୁରିଆ ଓ ଏମ ଓ ପି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ଦିନକ ପରେ ଏକର ପିଛା ୧.୩ ଲିଟର ପେଣ୍ଟିମିଥାଲିନ ୩୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ସହଯୋଗୀ ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ

କୃଷି ଭାରିକ କୌଶସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର ୧୮୦୦ ୧୮୦ ୧୫୫୧ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ।