



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି**  
**ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା**  
**ପଶୁମ ମାଳ ଅଂଚଳ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ,**  
**(ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ)**  
**ଭବାନୀପାଟଣା**



ପତ୍ର ସଂ - ୩୫

ସପ୍ତାହ- ୩୧

ତାରିଖ- ୦୩.୦୮.୨୦୧୮

**ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ - କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ**

**ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ - ୦୪.୦୮.୨୦୧୮ ରୁ ୦୮.୦୮.୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:**

ଆସନ୍ତା ୦୮.୦୮.୨୦୧୮ ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତ ମେଘୁଆ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପବନ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଦିଗରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୦୦୭ - ୦୦୭ କି.ମି. ବେଗରେ ବୋହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୦- ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୫ - ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ୮୪- ୯୨ % ଓ ୪୯-୬୨ % ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

**ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ**

ଆସନ୍ତା ୦୮.୦୮.୨୦୧୮ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟମ ରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ

- ୧. ଧାନ ରୁଆ ଶେଷ କରନ୍ତୁ .
- ୨. ବୁଣା ଯାଇଥିବା ମକା, କପା, ହରଡ଼, ଚିନାବାଦାମ ଜମି ରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଓ ଅତଃତାପ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
- ୩. ବର୍ଷା ପାଣି ଗାଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ ଓ ଅଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ.
- ୪. ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାଇ ଫସଲରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, କୀଟ ନାଶକ ଓ ତୃଣ ନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ.

**ଧାନ:**

- ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଧାନ ଚଳି ରୁଆ ଯିବାରୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି.
- ମୁଖ୍ୟଜମି କାଦୁଅ କରିବା ସମୟରେ ଏକରକୁ ୨ ଟନ ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ. ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକରକୁ ୩୫ କିଲୋ ଦି.ଏ.ପି. ସହିତ ୧୩ କିଲୋ ଏମ.ଓ.ପି.ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ. ସହଲ କିସମରେ ୨୫ କିଲୋ ଦି.ଏ.ପି. ସହିତ ୧୦ କିଲୋ ଏମ.ଓ.ପି ସାରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
- ରୁଆ ଧାନରେ ଧାନ ଚଳି ରୋଇବା ୨-୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକରକୁ ୬୦୦ ମିଲି ପ୍ରେତଳୀକାଚଳର କିମ୍ବା ୧୩୦୦ ମିଲି ପେଣ୍ଟିମେଥୁଲ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚଳି ୨-୪ ସପ୍ତାହ ତାରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି. ତିନି ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାନ ଚଳି ରୋପଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଜମି କାଦୁଅ କରନ୍ତୁ. ଓ ଧାନ ରୁଆ କରନ୍ତୁ.
- ଧାନ ଚଳି ଘେରା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥାରେ ୧୦ ଡେସିମିଲ ଚଳି ଘେରାରେ ୭୦୦ଗ୍ରାମ ଫିପ୍ରୋଥେନଲ ୦.୩ % G କିମ୍ବା ୧ କିଲୋ cartraphydrochloride ୪% ବାନାବାର ଔଷଧ ପକାନ୍ତୁ.
- ବୁଣା ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫-୬ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି. ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଧାନ ଜମିରେ ବେଉଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ. ସହଲ କିସମରେ ୨୦କିଲୋ ଯୁରିଆ ସହିତ ୧୦କିଲୋ ଏମ.ଓ.ପି. ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.

**କପା:**

- କପା ବର୍ତ୍ତମାନ ୪-୬ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି.
- ୬ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥାରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.

- ଶଙ୍କର କିସମ କପା ୬ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ୨୬ କିଲୋ ଯୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ. ଉନ୍ନତ କିସମ କପା ୬ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ୨୦ କିଲୋ ଯୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.

**ହରଡ଼:**

- ହରଡ଼ ଫସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩-୪ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି. ତିନି ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ କୋଡା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଗଛ ମୂଳ କୁ ମାଟି ଚେକି ଦିଅନ୍ତୁ.

**ମକା:**

- ମକା ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ - ୫ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି. ଜମି ରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ.

**ଆଖୁ:**

- ଆଖୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବା ରୁ ଅଂଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି (୨୧-୨୩ ସପ୍ତାହ) ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି. ସହଲ କାନ୍ଦ ବିନ୍ଧ ପୋକ ନିର୍ମୂଳ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମିଲି ତ୍ରିମୋଫୋସ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫାଇନଫୋସ ଔଷଧ କୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨ମିଲି ହିସାବ ରେ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
- ଆଖୁରେ ଭେଳା ବାନ୍ଧିବା କାମ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ.

**ଧନିତା:**

- ଧନିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ -୬ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି. ଧନିତା ୫-୬ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ଜମି ରେ ଚାଷ କରି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ

**ଚିନା ବାଦାମ:**

- ଚିନା ବାଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩-୪ ସପ୍ତାହ ହେବ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି. ତିନି ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ଚିନାବାଦାମ ରେ ହଳିକା କୋଡା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଗଛ ମୂଳ କୁ ମାଟି ଚେକି ଦିଅନ୍ତୁ. ଜମି ରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ.

ସହଯୋଗୀ ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ନୋଡାଲ ଅଫିସର

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା , ଭବାନୀପାଟଣା