

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

ପାଣିପାଗ ଖେତ୍ରୀୟ ଯୁନିଟ ଜି . ଉଦୟଗିରି

ଆଞ୍ଚଳିକ ଜେବେଷଣା ଓ ବୈଷିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଜି . ଉଦୟଗିରି , କନ୍ଧମାଳ

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷିୟକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର

ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ : ୦୭. ୦୮.୨୦୧୯ ଠାରୁ ୧୧. ୦୮.୨୦୧୯

ଜିଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା (ମି ମି)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ସେ ଗ୍ରେ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ସେ ଗ୍ରେ)	ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ	ସର୍ବାଧିକ ଆଦ୍ରତା	ସର୍ବାଧିକ ଆଦ୍ରତା	ବାୟୁ ର ଗତି	ବାୟୁ ର ଗତି ଦିଗ (ଡି)
ଫୁଲବାଣୀ	୦୭. ୦୮.୨୦୧୮	୪୦	୨୫	୨୧	୮	୯୪	୭୧	୧୦	୨୭୨
	୦୮. ୦୮.୨୦୧୮	୪୦	୨୫	୨୧	୮	୯୨	୮୧	୧୩	୨୨୩
	୦୯. ୦୮.୨୦୧୮	୫	୨୬	୨୨	୬	୯୨	୮୬	୭	୨୧୧
	୧୦. ୦୮.୨୦୧୮	୧୦	୨୮	୨୩	୩	୯୦	୬୨	୮	୨୭୧
	୧୧. ୦୮.୨୦୧୮	୩	୨୮	୨୪	୪	୮୫	୫୯	୯	୨୭୯

କୃଷି ଉପଦେଶ

- ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ୧୪୮ ମିଲି ମିଟର ବର୍ଷା ହାଇଲି ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୩୧ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 306.6 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୬.୮ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରହିଛି । ଜୁନ୍ ୧ ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୫୪.୯ ମିଲି ମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୧୭.୬ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ । ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବୁଣାବୁଣି କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ଓ ଧାନ ରୁଆ ରୋଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।

ସଂପ୍ରତି ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଗଜପତି, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି ।

ଖରିଫ ଧାନ

ବେଉଷଣ

- ❖ ସିଧା ବୁଣା ଧାନ 25 ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବେଉଷଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଘାସ ବାଛି କିସମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଆଗରୁ ମୂଲସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି 16 କିଗ୍ରା ଫସଫରସ୍ ଓ 16 କିଗ୍ରା ପଟାସ୍ ସାର ସହିତ ଅଥା (6 ରୁ 8 କିଗ୍ରା) ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ତଳି ରଥା

- ❖ ପାଣିର ସୁବିଧା ଥିଲେ ତଳି ରଥା କାମ କରନ୍ତୁ |
- ❖ ତଳି 3 ରୁ 4 ସପ୍ତାହର ହୋଇଗଲେ ରୋଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ |
- ❖ ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀକୁ ପ୍ରଥମେ 3 ରୁ 4 ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ | ରୋଇବା ଦିନ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରି ଜମିକୁ କାଦୁଅ କରନ୍ତୁ |
- ❖ ସବୁଜ ସାର ପାଇଁ ଆଜୋଲା ବଢ଼ାଇ ଥିଲେ କାଦୁଅ ବେଳେ ହଳ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ |
- ❖ ଏକର ପ୍ରତି 2 କିଗ୍ରା ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଆଜୋସିରିଲମ୍ ସହିତ 2 କିଗ୍ରା ପି. ଏସ୍. ବି ଖତ ସହିତ ମିଶାଇ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
- ❖ ଶେଷ ଓଡ଼ କାଦୁଅରେ ଏକର ପ୍ରତି 12 ରୁ 16 କିଗ୍ରା ଫସଫରସ୍ ଓ 12 ରୁ 16 କିଗ୍ରା ପଟାସ୍ ସାର ସହିତ ଅଧା (6 ରୁ 8 କିଗ୍ରା) ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
- ❖ ତଳିଘରାରେ ଦାନାଦାର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ 1 ମିଲି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଔଷଧକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ତଳି ଚେରକୁ 8 ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ |
- ❖ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 15 -20 ସେମି ଓ ବୁଦାକୁ ବିଦା 10 ସେମି ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ତଳି ରଖନ୍ତୁ | ବୁଦା ପ୍ରତି 2-3ଟି କରି ତଳି ସିଧା ଓ ଅଗଭୀରରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ❖ ରଥା ପରେ ଜମିରେ ରୁପୁରୁପିଆ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ |

ମକା

- ❖ ମକା ଫସଲ ଲଗାଇବାର 6 ସପ୍ତାହ ପରେ (ଚଅଁର ବାହରିବା ଅବସ୍ଥା) ଘାସ ବାନ୍ଧି ଏକର ପ୍ରତି ଅନୁମୋଦିତ ସାର (80-40-40)ର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର କୁ (8 କିଗ୍ରା) ଗଛ ମୂଳରୁ 10 ସେମି ଛାଡ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ | ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ | ଗଛ ଉପରେ କିମ୍ବା ଗଛର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ସାର ପଡ଼ିଲେ ଗଛ ଝାଉଁଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ |
- ❖ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମକା ଫସଲରେ ଫଲ୍ ଆର୍ମି ଓର୍ମ ଲଗିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି | ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ଗ୍ରାମ୍ ଏମାମେକ୍ସିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ୫% ଏସ୍.ଜି. କିମ୍ବା ୮୦ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରାନଟ୍ରାନିଲୋପ୍ରିଲୋ ୧୮.୫ % ଏସ୍.ସି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |

ଧାନ ଫସଲ

କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬-୮ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବୃଷ୍ଟିପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି , ତେଣୁ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଧାନ ତଳି ରୋଇବା କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ, ରୋଇବା ସମୟରେ ଜବକ୍ଷାରଯାନ ଜାତୀୟ ସାର ର ୨୫ ଭାଗ , ସମୁଦାୟ ଫସଫରସ୍ ଓ ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗ ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରି ରୋଇଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ |

ବିଶେଷ ସୂଚନା

କୃଷି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିନା ଦେୟରେ କିସାନ କଲ କେନ୍ଦ୍ର (Kisan call center)

ଫସଲ ବୀମା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କରନ୍ତୁ

ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା ଜି . ଉଦୟଗିରି

