



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା**  
**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ. – ସେମିଲିଗୁଡ଼ା**  
**ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ**  
**ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର**  
**ସେମିଲିଗୁଡ଼ା, ପି. ବି.-୧୦, ସୁନାବେଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୩୦୦୨**



ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୦୮

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃଷି ଉପଦେଶ

ତାରିଖ – ୨୦.୦୨.୨୦୧୮

**ଜିଲ୍ଲା- କୋରାପୁଟ (ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋନ)**

ଗତ ଚାରି ଦିନର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା				
ତାରିଖ	୧୭.୦୨.୧୮	୧୭.୦୨.୧୮	୧୮.୦୨.୧୮	୧୯.୦୨.୧୮
ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	୦	୦	୦	୦
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୨୯	୨୯	୩୧	୩୦
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୧୩	୧୩	୧୩	୧୪

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର (୨୧.୦୨.୨୦୧୮ ଠାରୁ ୨୫.୦୨.୨୦୧୮) ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ  
(ଏମ.ସି.,ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ)

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ରହିବ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୪୬ ରୁ ୮୭ ଭାଗ ଏବଂ ୧୩ ରୁ ୧୭ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ତାରିଖ	୨୧.୦୨.୧୮	୨୨.୦୨.୧୮	୨୩.୦୨.୧୮	୨୪.୦୨.୧୮	୨୫.୦୨.୧୮
ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	୦	୦	୦	୦	୦
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୩୧	୩୧	୩୧	୩୧	୩୧
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୧୪	୧୪	୧୪	୧୪	୧୪
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ	୨	୦	୦	୦	୦
ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	୮୭	୮୫	୮୦	୬୧	୪୬
ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	୧୭	୧୭	୧୪	୧୪	୧୩
ପବନର ବେଗ (କି.ମି./ଘଣ୍ଟା)	୪	୩	୩	୪	୪
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	୨୦୭	୨୧୬	୧୭୬	୧୭୩	୧୭୩

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

**ଡାକ୍ଷୁଅ ଧାନ:**

- ଡାକ୍ଷୁଅ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସଅଳ ଓ ମଧ୍ୟମ କିସମ ବିହନ କୁ ଗଜା କରି ତଳି ଘେରା ରେ ପକାନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ତଳି ତିନି ସପ୍ତାହ ର ହୋଇଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏକର କୁ ୮ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟମ କିସମରେ ୩୫ କିଲୋ ଡ.ଏ.ପି. ଓ ୧୩ କିଲୋ ଏମ.ଓ.ପି. ଏବଂ ସଅଳ କିସମରେ ୨୫ କିଲୋ ଡ.ଏ.ପି. ଓ ୧୦ କିଲୋ ଏମ.ଓ.ପି. ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ ଭଲଭାବେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଶତକଡ଼ା ୧୨ ରୁ ୧୩ ଭାଗ ଜଳୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।

**ପିଆଜ:**

- ପିଆଜ ଚାରା ୮ ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏକରକୁ ୨ ଟନ ଗୋବର ଖତ, ୨୭ କିଲୋ ୟୁରିଆ, ୪୩ କିଲୋ ଡି.ଏ.ପି., ୩୩ କିଲୋ ଏମ.ଓ.ପି. ଓ ୨୦ କିଲୋ ସଲଫର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

**ଟମାଟୋ :**

- ୬-୭ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ କୋଡା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ୫୪ କିଲୋ ୟୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହୁଡା ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଟମାଟୋ ର ପତ୍ର ମୋଟା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଧଳା ମାଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର କୁ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ଏସିଫେଟ ୭୫ % ଏସପି କିମ୍ବା ୫୦ ମିଲି ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୧୭.୮ % ଏସଏଲ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ପନିପରିବା ଫସଲ:**

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଚିତ୍ତାରୋଗ (ବ୍ଲାଇଟ) ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମେନକୋଜେବ ୭୫% WP ୨ ଗ୍ରା./ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ତଳି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲରେ ମୂଳ ପତା ରୋଗ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ମୂଳ ପତା ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରା. କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମାଟି ଭଲଭାବେ ଭିଜିପାରିବ ।

**ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ:**

- ଉଚ୍ଚଜମିରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ବିରି ଏବଂ ମୁଗ ବୁଣିବା କାମ ପୁରା କରନ୍ତୁ । ବିରି ପାଇଁ କିସମ - T ୯, PU ୧୧, PU ୧୯ ଏବଂ PU ୩୦; ମୁଗ ପାଇଁ କିସମ - K ୮୫୧, PDM ୧୧, PDM ୫ ଏବଂ OUM ୧୧୫ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ସହିତ ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚରକୁ ମିଶାଇ ଜମିରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।
- ଜମିରେ ମୂଳସାର ଭାବେ ୪ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ, ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି. ଏବଂ ୧୩ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି. ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ୩୦ x ୧୦-୧୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ୩ ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ ।
- ମୁଗ ଓ ବିରି ରେ ପତ୍ର ଖୁଆ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର କୁ ୪୦୦ ମିଲି ଟ୍ରାଇଜୋଫସ ଔଷଧ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ଡେଲବାଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ:**

- ରାଶି ବୁଣିବା ପାଇଁ କିସମ ପ୍ରାଚୀ, କଳିକା, କନକ, ବିନାୟକ, ଅମୃତ ଅଥବା ନିର୍ମଳା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ।
- ଶୀତଦିନିଆ ଚିନାବାଦାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକ ସମୟ । ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଦୂରତା ୩୦ ସେ.ମି. ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ଦୂରତା ୧୦-୧୫ ସେ.ମି. ରଖନ୍ତୁ । ଏକର ପିଛା ୫୦ କି.ଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବୁଣିବାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ୫୦ କି.ଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ୬୦୦ ଗ୍ରା. ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚରକୁ ମିଶାଇ ବୁନନ୍ତୁ । ଲଗାଇବାବେଳେ ଏକର ପିଛା ୪ କି.ଗ୍ରା ୟୁରିଆ, ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି. ଏବଂ ୨୭ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି., ୧୦ କି.ଗ୍ରା ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ଏବଂ ୪ କି.ଗ୍ରା ବୋରାକ୍ସକୁ ମୂଳସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

**ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିବ୍ୟ:** ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେ.ଭି.କେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅଫିସର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ।

**ଡଃ. କେଦାରଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ**  
**(ନୋଡାଲ ଅଫିସର)**