



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ. – ସେମିଲିଗୁଡା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର
ସେମିଲିଗୁଡା, ପି. ବି.-୧୦, ସୁନାବେଡା, କୋରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୩୦୦୨



ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୩୭

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃଷି ଉପଦେଶ

ତାରିଖ – ୧୧.୦୯.୨୦୧୮

ଜିଲ୍ଲା- ନବରଙ୍ଗପୁର (ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋନ)

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର (୧୨.୦୯.୨୦୧୮ ଠାରୁ ୧୬.୦୯.୨୦୧୮) ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ

(ଏମ.ସି.,ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ)

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ରୁ ମଧ୍ୟମ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତ ମେଘୁଆ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ରୁ ୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୩ ରୁ ୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୮୦ ରୁ ୯୦ ଭାଗ ଏବଂ ୪୨ ରୁ ୫୧ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ତାରିଖ	୧୨.୦୯.୧୮	୧୩.୦୯.୧୮	୧୪.୦୯.୧୮	୧୫.୦୯.୧୮	୧୬.୦୯.୧୮
ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	୫	୧୦	୨	୨	୫
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୩୩	୩୪	୩୪	୩୨	୩୨
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୨୪	୨୪	୨୪	୨୩	୨୪
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ	୭	୫	୬	୭	୫
ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	୮୬	୯୦	୮୨	୮୦	୮୨
ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	୫୧	୪୯	୪୨	୪୩	୪୨
ପବନର ବେଗ (କି.ମି./ଘଣ୍ଟା)	୮	୮	୮	୭	୭
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	୨୪୫	୨୫୫	୨୫୧	୨୬୭	୨୮୦

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

- କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପାଗ ଦେଖିକି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଉଚ୍ଚ ଜମି ଫସଲରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଜଳନିକାସ ନଳା ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ।

ଖରିଫ ଧାନ:

- ଉଚ୍ଚ ବୁଣା ଧାନ ଜମିରେ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସେକ୍ସଥର ଘାସ ବାଛିବା ପରେ ଏକର ପିଛା ୧୩ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିୟା ପିଲସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମଝିଆଳି ଓ ଖାଲ ଜମିରେ ସିଧା ବୁଣା ଧାନ ୩ ସପ୍ତାହର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବେଉଷଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଏକର ପିଛା ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ରୁଆ ଧାନ ଜମି ୨୧ ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏକର ପିଛା ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମିରେ ୨ ଦିନ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ।
- ପତ୍ର ମୋଡା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ଡେଲ୍ଟାମେଥ୍ରିନ + ଗ୍ରାଯାଜଫସ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୁଆ ଧାନ ଜମିରେ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୪ ଟି ହିସାବରେ ଫେଡୋମୋନ ଯନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଯନ୍ତା ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ଟି ହୋଇଯିବ, ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪.୫ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରାନିଲିପ୍ରୋଲ ୧୮.୫% SC ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମକା:

- ଜମିରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଦା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଗଲେ ଗ୍ରାହ୍ୟାଙ୍କଫସ ୪୦% EC ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଜଉ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଏ । ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ଡାଇମେଥୋଏଟ ୩୦% EC ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପନିପରିବା ଫସଲ:

- ତଳି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲରେ ମୂଳ ପତା ରୋଗ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମାଟି ଭଲଭାବେ ଭିଜିପାରିବ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଚିତ୍ତରୋଗ (ବ୍ଲାଇଟ) ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମେନକୋଜେବ ୭୫% WP ୨ ଗ୍ରା./ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିବ୍ୟ: ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେ.ଭି.କେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅଫିସର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ।

ଡଃ. କେଦାରଶ୍ଵର ପ୍ରଧାନ
(ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର)