



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା**  
**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ. – ସେମିଲିଗୁଡ଼ା**  
**ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ**  
**ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର**  
**ସେମିଲିଗୁଡ଼ା, ପି. ବି.-୧୦, ସୁନାବେଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୩୦୦୨**



ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୦୮

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃଷି ଉପଦେଶ

ତାରିଖ – ୨୦.୦୨.୨୦୧୮

ଜିଲ୍ଲା- ନବରଙ୍ଗପୁର (ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋନ)

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର (୨୧.୦୨.୨୦୧୮ ଠାରୁ ୨୫.୦୨.୨୦୧୮) ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ

(ଏମ.ସି.,ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁସାଧନା)

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୩୪ ରୁ ୬୬ ଭାଗ ଏବଂ ୧୧ ରୁ ୧୫ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ତାରିଖ	୧୭.୦୨.୧୮	୧୮.୦୨.୧୮	୧୯.୦୨.୧୮	୨୦.୦୨.୧୮	୨୧.୦୨.୧୮
ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	୦	୦	୦	୦	୦
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୩୪	୩୫	୩୫	୩୬	୩୬
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୧୮	୧୮	୧୮	୧୮	୧୮
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ	୧	୦	୦	୦	୦
ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	୬୬	୬୬	୫୭	୫୦	୩୪
ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	୧୫	୧୩	୧୧	୧୨	୧୧
ପବନର ବେଗ (କି.ମି./ଘଣ୍ଟା)	୫	୩	୬	୬	୫
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	୨୦୦	୧୯୭	୧୮୨	୧୮୯	୧୯୭

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

ଡାକ୍ଷୁଧ ଧାନ:

- ଡାକ୍ଷୁଧ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସଅଳ ଓ ମଧ୍ୟମ କିସମ ବିହନ କୁ ଗଜା କରି ତଳି ଘେରା ରେ ପକାନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ତଳି ତିନି ସପ୍ତାହ ର ହୋଇଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏକର କୁ ୮ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟମ କିସମରେ ୩୫ କିଲୋ ଡ.ଏ.ପି. ଓ ୧୩ କିଲୋ ଏମ.ଓ.ପି. ଏବଂ ସଅଳ କିସମରେ ୨୫ କିଲୋ ଡ.ଏ.ପି. ଓ ୧୦ କିଲୋ ଏମ.ଓ.ପି. ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ ଭଲଭାବେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଶତକଡ଼ା ୧୨ ରୁ ୧୩ ଭାଗ ଜଳୀୟଅଂଶ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।

ପିଆଜ:

- ପିଆଜ ଚାରା ୮ ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏକରକୁ ୨ ଟନ ଗୋବର ଖତ, ୨୭ କିଲୋ ୟୁରିଆ, ୪୩ କିଲୋ ଡ.ଏ.ପି., ୩୩ କିଲୋ ଏମ.ଓ.ପି. ଓ ୨୦ କିଲୋ ସଲଫର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଚମାଟୋ :

- ୬-୭ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ୫୪ କିଲୋ ୟୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହୁଡ଼ା ଚେକି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

- ଟମାଟୋ ର ପତ୍ର ମୋଟା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଧଳା ମାଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର କୁ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ଏସିଫେଟ ୭୫ % ଏସପି କିମ୍ବା ୫୦ ମିଲି ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୧୭.୮ % ଏସଏଲ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ପନିପରିବା ଫସଲ:**

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଚିତ୍ତାରୋଗ (ବ୍ଲାଇଟ) ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମେନକୋଜେବ ୭୫% WP ୨ ଗ୍ରା./ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ତଳି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲରେ ମୂଳ ପତା ରୋଗ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ମୂଳ ପତା ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରା. କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମାଟି ଭଲଭାବେ ଭିଜିପାରିବ ।

**ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ:**

- ଉଚ୍ଚଜମିରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ବିରି ଏବଂ ମୁଗ ବୁଣିବା କାମ ପୁରା କରନ୍ତୁ । ବିରି ପାଇଁ କିସମ - T ୯, PU ୧୧, PU ୧୯ ଏବଂ PU ୩୦; ମୁଗ ପାଇଁ କିସମ - K ୮୫୧, PDM ୧୧, PDM ୫ ଏବଂ OUM ୧୧୫ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ସହିତ ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚରକୁ ମିଶାଇ ଜମିରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।
- ଜମିରେ ମୂଳସାର ଭାବେ ୪ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ, ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି. ଏବଂ ୧୩ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି. ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ୩୦ x ୧୦-୧୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ୩ ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ ।
- ମୁଗ ଓ ବିରି ରେ ପତ୍ର ଖୁଆ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର କୁ ୪୦୦ ମିଲି ଟ୍ରାଇଜୋଫସ ଔଷଧ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ତୈଳବାଜି ଜାତୀୟ ଫସଲ:**

- ରାଶି ବୁଣିବା ପାଇଁ କିସମ ପ୍ରାଚୀ, କଳିକା, କନକ, ବିନାୟକ, ଅମୃତ ଅଥବା ନିର୍ମଳା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ।
- ଶୀତଦିନିଆ ଚିନାବାଦାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକ ସମୟ । ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଦୂରତା ୩୦ ସେ.ମି. ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ଦୂରତା ୧୦-୧୫ ସେ.ମି. ରଖନ୍ତୁ । ଏକର ପିଛା ୫୦ କି.ଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବୁଣିବାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ୫୦ କି.ଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ୬୦୦ ଗ୍ରା. ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚରକୁ ମିଶାଇ ବୁନ୍ତୁ । ଲଗାଇବାବେଳେ ଏକର ପିଛା ୪ କି.ଗ୍ରା ୟୁରିଆ, ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି. ଏବଂ ୨୭ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି., ୧୦ କି.ଗ୍ରା ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ଏବଂ ୪ କି.ଗ୍ରା ବୋରାକ୍ସକୁ ମୂଳସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

**ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିବ୍ୟ:** ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେ.ଭି.କେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅଫିସର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ।

**ଡଃ. କେଦାରଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ**  
(ନୋଡାଲ ଅଫିସର)