



କ୍ର.ନଂ. 302

ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ. – 09

ତାରିଖ- 03.03.2020

(ସୌଜନ୍ୟ – ଓୟୁଏଚ୍‌ସିଡି କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ପ୍ରାଣୀପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ)

ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଫସଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କୃଷି ପରାମର୍ଶ

ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ପବନ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛରୁ ମଧ୍ୟମ ଧାରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

- ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଲରେ ଥିବା ଡାଳି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ପନି ପରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
- ଡାଳୁଅ ଧାନ ଜମିରେ ବର୍ଷା ପଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ।
- ତୋଳାଯାଇଥିବା ସଅଳ କିସମ ଡାଳିଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା ମୁଗ, ବିରି ଏବଂ ପନିପରିବା ଯଥା ପିଆଜ, ଆଳୁ କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।
- ପନିପରିବା ତଥା ଖରାଟିଆ ଡାଳି ଜାତୀୟ (ମୁଗ, ବିରି ପ୍ରଭୃତି) ଓ ଡେଲବାଜ ଫସଲ ଓ ରାଶି ବୁଣା ବୁଣି ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଂଚନ ଓ ଜଳସେଚନ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ତେବେ ଧାନରେ ମହିଷା ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ମହିଷା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଗ୍ରାଜ୍‌ପୋକ୍ସିଷ୍ଟୋଭିନ ସହିତ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ (ବାନ, ବିମ) ୦.୪ ଗ୍ରାମ୍ ଏକ ଲିଟର ପଣି ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବିଳମ୍ବ କିସମର ବିଲାତିବାଇଗଣ ତଳିଘେରକୁ ଧଳା ପଲିଥିନରେ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପ, ସେବତୀ ଆଦି ଫୁଲର ମାନ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଓ କୋହଲା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସୋରିଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଚିନାବାଦାମ ଆଦି ଡେଲବାଜ ଫସଲରେ, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ଡାଳିଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଓ ପନିପରିବାରେ ଜଉପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତେଣୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫସଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ୍ ଆୟୋମେଥୋକ୍‌କ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ୫୦ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ କିମ୍ବା ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଏସିମିପିପ୍ରିଡ୍ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ଫସଲରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ବା ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ + ମାକୋଜେବ୍ ମିଶ୍ରିତ ଔଷଧକୁ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଷା ହେତୁ ସହଜ ବୁଣା ଖରାଟିଆ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡ ପତା ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା କମିଗଲା ପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାରବେନଡାଜିମ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଡାଳିଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ଭାଲିଡାମାକ୍‌ସିନ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ପନିପରିବା ତଳିଘରରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨-୩ ଗ୍ରାମ୍ ଥିରାମ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ତଳିରେ ପତ୍ରବାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ବା ୧ ମି.ଲି. ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏହି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ମେଟାଲାକ୍‌ସିଲ୍ + ମାକୋଜେବ୍ ମିଶ୍ରିତ ଔଷଧ କିମ୍ବା ୦.୨ ଗ୍ରାମ୍ ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟୋଭିନ୍ + ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ଔଷଧ ମିଶାଇ ୨ ରୁ ୩ ଥର ଅଦଳ ବଦଳ କରି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବିଲାତି ବାଇଗଣରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କ୍ଲୋରୋଥାଲାମିଲ୍ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଝୁଡ଼ଙ୍ଗରେ କଳଙ୍କି ରୋଗ ଦେଖାଯିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କ୍ଲୋରୋଥାଲାମିଲ୍ କିମ୍ବା

୨ ଗ୍ରାମ୍ ଅକ୍ଟୋବୋକ୍ସିନ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

- ସୋରିଷ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଭଲଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ସୋରିଷ ଅମଳ କରି ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।

କୃଷି ଉପଦେଶ

କ୍ଷେତ ଫସଲ

ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ

ଧାନ-ମୂଖ୍ୟ କିଆରୀର ଯତ୍ନ

- ରବିଧାନ-ଧାନ ରୋଇବାର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜମିରେ ୬ କିଗ୍ରା BGA କିମ୍ବା ୪ କିଗ୍ରାଲ ଆଜୋଲା ଏକର ପିଛା ୫୦ କିଗ୍ରା ଫସଫରସ ସହ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଜମିରୁ ପାଣି ଶୁଖାଇ ଦେଇ ଓ ଚାଷ କରି ଆଜୋଲା କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜମିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଜମିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆଦ୍ରତା ରହିଲେ ୧୬ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ତାପମାତ୍ରା ବହୁଥିବାରୁ ୫ଟି ଫେରୋମେନ ଯନ୍ତ୍ରା ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ଜମିରେ ରଖନ୍ତୁ ।

କ. ଆଜୋଲା

- ଧାନ ରଥା ସରିଥିଲେ, ଏହାର 7 ଦିନ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି 4 କିଗ୍ରାଲ ଆଜୋଲା ଜମିରେ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ । 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଜମିରୁ ପାଣି କାଟି ଜାପାନିଜ୍ ଉତ୍ପତ୍ତର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜୋଲାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଖ. ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ (ବି.ଜି.ଏ)

- ଧାନ ରଥାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକରକୁ 6 କିଗ୍ରା ହିସାବରେ ବି.ଜି.ଏ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । 50 କିଗ୍ରା ସୁପର ଫସଫେଟ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜମିରୁ ପାଣି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବି.ଜି.ଏ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 10 କିଗ୍ରା ହିସାବରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଫସଲକୁ ମିଳିଥାଏ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମୂଖ୍ୟ କିଆରୀରେ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକର ପ୍ରଜାପତି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ତେଣୁ ପ୍ରଜାପତି ଧରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 4 ଗୋଟି ଫେରୋମୋନ ଯନ୍ତ୍ରା ବସାନ୍ତୁ ।
- ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ତାରତମ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ମୂଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ମହିଷା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 0.6 ଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଉପଦୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ 1 ମିଟର ଓସାର ପରିରେ ଧାନ ରଖନ୍ତୁ । ଦୁଇପଟି ମଝିରେ 30 ସେମି ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ ।

ଖରାଟିଆ ମୁଗ ଓ ବିରି

- ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଖରାଟିଆ ମୁଗ ଓ ବିରି ବୁଣାବୁଣି କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।

ଫସଲ	କିସମ	ଅବଧି
ମୁଗ	IPM 2-14	60-65
	ପି.ଡି.ଏମ୍-11	60-65
	ପି.ଡି.ଏମ୍-84-139 (ସମ୍ଭାର୍)	60-65
	ଓ.ୟୁ.ଏମ୍-011-5 (କାମଦେବ)	60-65
ବିରି	ବିରାଟ	60-65
	ସାରଳା	65-70
	ପଛ-ୟୁ-ଏମ୍-19	65-70
	ପଛ-ୟୁ-ଏମ୍-30	65-70
	ପଛ-ୟୁ-ଏମ୍-26	65-70

- ଏକର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ପାଇଁ 10 କିଗ୍ରା ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି 2 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସଜା ଗୋବର ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମ ପାଇଁ 8 କିଗ୍ରା

ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 16 କିଗ୍ରା ଫସଫରସ୍ ଓ 8 କିଗ୍ରା ପଟାସ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

- ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବିହନକୁ 2 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଇମ୍ ବା 3 ଗ୍ରାମ୍ ଥିରାମ୍ ରେ ଗୋଳାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବାର 7 ଦିନ ପରେ ବୀଜାଣୁ କଲଚରରେ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ ।
- ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବଧାନ 25 ସେମି ରଖି ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ ।
- ବୁଣିବାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଛ କୁ ଗଛ 10 ସେମି ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଗଛକୁ ପତଳା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଗହମ

- ⊗ କିଆରୀରେ ଉଚ୍ଚ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ଗଛ ଦେଖାଦେଲେ ବାରମ୍ବାର ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ 2 ମିଲି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ 20 ଲସି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଏକର ପ୍ରତି 10 କିଗ୍ରା କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ଅଖାରେ ରଖି କିଆରୀକୁ ପାଣି ପଶୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ⊗ ଗହମ 5 ସପ୍ତାହର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକର ପ୍ରତି 8 କିଗ୍ରା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୀର୍ଷ ସାର ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ⊗ କାଣ୍ଡ ବିକ୍ଷା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି ଗ୍ରାୟୋଜଫସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଫେନୋଫସ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ

- ଡାଲି ଫସଲରେ ପାଇଁଶିଆ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ଗ୍ରାମ୍ ସଲଫେନ୍ସ ସେଚିତ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି 1 କିଗ୍ରା ଗନ୍ଧକ ସେଚିତ ଗୁଣ୍ଡ ସହ 200 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ମଟର ଫସଲରେ ଫଳବିକ୍ଷା ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପ୍ରତି 250 ଶୁକ ସମତୁଲ ଏନ.ପି.ଭି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି 2 କିଗ୍ରା ବିଟି ବୀଜାଣୁ କଲଚର 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ମକା

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି

- ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି 4 ରୁ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଉଚ୍ଚ ପ୍ରବଣ ଅଚଳରେ ଏକର ପ୍ରତି 10 କିଗ୍ରା ଶତକଡା 1 ଭାଗ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଶେଷଓତ ଚାଷ ବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ଓତ ଚାଷ ବେଳେ ଏକର ପ୍ରତି 2 ଟନ୍ ସଭା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ବିହନ ବିଶୋଧନ

- ପ୍ରତି କିଗ୍ରା ବିହନରେ 1.5 ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଇମ୍ କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ୍ ଥିରାମ୍ ମିଶାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 45 ସେମି ଓ ମଞ୍ଜିକୁ ମଞ୍ଜି 25 ସେମି ଓ 5 ସେମି ଗଭୀରରେ ମଞ୍ଜି ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଏକର ପ୍ରତି 6 କିଗ୍ରା ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ସାର ପ୍ରୟୋଗ

- ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଏକର ପ୍ରତି 16 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 16 କିଗ୍ରା ଫସଫରସ୍ ଓ 16 କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାର କିଛି ଖତ ସହିତ ମିଶାଇ ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିଧରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ମଞ୍ଜି ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଲଗାଇବାର 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏକର ପ୍ରତି 400 ଗ୍ରାମ୍ ଏଗ୍ରାଜିନ୍ କିମ୍ବା ସିମାଜିନ୍ କିମ୍ବା 600 ମିଲି ଆଲାକ୍ଲୋର 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଲର ଦମନ ହୋଇଥାଏ ।

କିସମ	ଅବଧି, ଦିନ	ଏକର ପ୍ରତି ଅମଳ (କୁଇଣ୍ଟାଲ)	ରଙ୍ଗ
କମ୍ପୋଜିଟ୍			
ଧବଳ	100-110	24	ଧଳା
ନଭଜୋଡ଼			ହଳଦିଆ
ସଙ୍କର ଜାତୀୟ			
ଡେକାନ୍	100-110	16	ହଳଦିଆ
ଗଜା	100-110	24	ହଳଦିଆ

ଡେକାନ୍ 105	100-110	24	ହଲଦିଆ
କାର୍ଗିଲ୍ 900 ଏମ୍	125	28	ହଲଦିଆ
କାର୍ଗିଲ୍ 633	120	26	ହଲଦିଆ
ପିଆରଓ 345	100-110	24	ହଲଦିଆ
ବିସ୍କୋ 2418	90-110	22	ହଲଦିଆ

➤ ଏକର ପ୍ରତି 6 କିଗ୍ରା ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ରବି ମକା

- ସଞ୍ଚଳ ଲଗାଯାଇଥିବା ଫସଲ 6-7 ସପ୍ତାହର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କୋଡାଖୁସା କରି ଏକର ପ୍ରତି 8 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ଯୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 2000 ଗ୍ରାମକୋଗ୍ରାମା ଚିଲୋନିସ୍ ପରାଶ୍ରୟୀ ଯୋକର ଅଣ୍ଡା 10 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇଥର ଛାଡନ୍ତୁ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ-ବର୍ତ୍ତମାନର ତାପମାତ୍ରା ପତ୍ରଖୁଆ ସଂବାଳୁଆ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ 400 ମି.ଲି ଏଣ୍ଡୋସୋଲଫାନ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ରବି ଚିନାବାଦାମ

- ରବି ଚିନାବାଦାମ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଅମଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ

ଖରାଟିଆ ଚିନାବାଦାମ

- ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ଉଚ୍ଚୁଣିଆ ଯୋକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ 400 ମିଲି ଡାଇମେଥୋଏଟ କିମ୍ବା ୫୦ ମି.ଲି ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଟୀକା ରୋଗ ଏବଂ ଧଳା ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ଲିଟାକ୍ସ ୫୦ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏବଂ ୨ ମି.ଲି କ୍ଲୋରୋଫାରିଫସ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ସୋରିଷ

- ❖ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ସୋରିଷ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଭଲଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ସୋରିଷ ଅମଳ କରି ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।

ରାଶି

- ଫେବୃଆରୀ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ରାଶି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏପରି କଲେ ଅମଳ ବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଉନ୍ନତ ବିହନ କିସମ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲ

ପନିପରିବା

- ✚ ଫୁଲ କୋବିରେ ଶତକଡା 0.2 ଭାଗ ବୋରାକ୍ସ ସିଞ୍ଚନ କଲେ କୋବିଫୁଲ ପତା ହୁଏ ନାହିଁ ।
- ✚ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧାକୋବି ଓ ଫୁଲକୋବିରେ କାଳୀମୁଣ୍ଡି ଯୋକ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 1 କିଗ୍ରା ବିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିମ୍ବା 250 ଏଲ.ଏ.ଏସ. ଏଲ. ଏନ.ପି.ଭି ଏକ ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ✚ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ବାଇଗଣରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡ ବିକ୍ଷା ଯୋକ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । 20,000 ଗ୍ରାମକୋଗ୍ରାମା ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ ଛାଡନ୍ତୁ କିମ୍ବା 300 ପିପିଏମ୍ ନିମ୍ବ ଜାତ କୀଟନାଶକ ବିଷକୁ ଏକର ପ୍ରତି 1 ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଛଡା ଏହି ଯୋକର ଦମନ ପାଇଁ ସଙ୍ଗ ଏକର ପ୍ରତି 5ଟି ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ର ବସାନ୍ତୁ । ଏବଂ ବାଇଗଣରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ସହିତ 20 ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରୋଇଡ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ✚ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଅଷ୍ଟପଦାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 4 ମିଲି ହିସାବରେ କେଲଥେନ୍ କିମ୍ବା ଡାଇକୋଫଲ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ✚ ଝାଉଁଳା ସହଣୀ ଥିବା ଲଙ୍କା କିସମ ଯଥା – ଉତ୍କଳ ରଶ୍ମୀ, ଉତ୍କଳ ଆଭା ଲଗାନ୍ତୁ । ଉଚ୍ଚୁଣିଆ ଯୋକ ଦେଖାଗଲେ ପତ୍ର ମୋଟା

ହୋଇଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 350 ମିଲି ଇଥିଅନ୍ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

- ✚ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଲଙ୍କା ଓ କ୍ୟାସ୍ଟିକମ୍ ଫସଲରେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 1.5 ମିଲି ଇଥିଅନ୍ କିମ୍ବା 2 ମିଲି କାର୍ବୋସଲ୍ମିନ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଖଡା ଶାଗ

- ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଡା ଶାଗ ଲଗାଇବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଜମିକୁ ୫*୪ ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ପଟାଳିରେ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୪-୬ କିଗ୍ରା ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପରେ ତାକୁ ମାଟି କିମ୍ବା ନଡା ରେ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପଟାଳି ଗୁଡିକରେ ପାଣି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୨-୧୫ ଦିନ ପରେ ନଡା କୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୦-୧୫ ଦିନିଆ ଶାଗ ତଳି ଗୁଡିକୁ ଜମିରେ ରୋପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।

ଆଳୁ

- ✚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଯାଇଛି ।
- ✚ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ପାକଳ ଆଳୁକୁ ଜମିରେ ନରଖ୍ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରନ୍ତୁ ।
- ✚ ଆଳୁ ଅମଳ ପରେ ଆଳୁ ବିହନ ପାଇଁ ପତା, କଟା ଆଳୁ ସବୁ ବାଛି ଭଲ ଆଳୁ ରଖନ୍ତୁ । ସେଥିରୁ 25 ରୁ 30 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ଆଳୁ ସବୁ ବାଛି ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତାପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 30 ଗ୍ରାମ୍ ବୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ ମିଶାଇ ବିହନ ଆଳୁ ଗୁଡିକୁ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଜାଇ ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଖା ମୁଣାରେ ଭର୍ତ୍ତିକରି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ୍ ରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ପିଆଜ

- ପିଆଜର ପତ୍ର ପାତା ସହ ଆଞ୍ଚୁଡା ଦାଗ ଦେଖାଦେଲେ ପତ୍ର ଉକୁଣି ଲାଗିବାର ଜଣାଯାଏ । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି ଡାଇମେଥୋଏଟ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।
- ଅନାବନା ଘାସ ପିଆଜ ଫସଲର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ । ପିଆଜ ଗଛର ଚେର ମାଟିର ଉପର ଭାଗରେ ରହେ ଓ 15 ସେମିଟୁ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମାଟିର ଉପର ଭାଗ ହାଲୁକା ରହିବା ଦରକାର । ଗହୀରିଆ କୋଡାଖୁସା କରିବା ଅନୁଚିତ । 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 2 ରୁ 3 ଥର ହାଲୁକା କୋଡା ଖୁସା କରି ଅନାବନା ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । 60 ଦିନ ପରେ ଦରକାର ହେଲେ ଅନାବନା ଘାସକୁ 2 ରୁ 3 ଥର ହାତରେ ଉପାଡି ଜମିକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।

ସଜନା

- ❖ ଛୁଇଁବିକ୍ଷା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି କ୍ରୀୟାଶୀଳ ସାରପର ସେଥିମ୍ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 2 ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ପୋଚଳ

ବିଳମ୍ବରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପୋଚୋଳରେ ଫୁଲ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ, ଜମିକୁ କୋଡାଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ରେ ସାର ପକାନ୍ତୁ ।

ବାଇଗଣ / ବିଲାତି ବାଇଗଣ

- ବାଇଗଣ ଓ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଗଛ ଭଳି ପଡିଲେ ଗଛ ମୂଳକୁ ମାଟିଦେଇ ବାଉଁଶ ବା ବାଡି ପୋତି ସିଧା ଭାବରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
- ବାଇଗଣ ଓ ବିଲାତି ବାଇଗଣର ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ + ୩ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସି କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ଘୋଳ ମୂଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଫଳପତା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୧୨% + ମାନକୋଜେବ୍ ୬୩% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ମିଶାଇ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ଫିଫିନାଶକ ମିଶ୍ରଣ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଲଙ୍କାମରିଚ

- ଲଙ୍କା ମରିଚ ଫସଲରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଥ୍ରୀସ୍ପ ଓ ଅଷ୍ଟପଦୀ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୩ ଗ୍ରାମ୍ ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ୍ କିମ୍ବା ୨ ମି.ଲି ଫେନପାଇରୋକ୍ସିମେଟ୍ ୫% ଇ.ସି. କିମ୍ବା ୧ ମି.ଲି. ଆବାମେକ୍ସିନ୍ ୧.୯% ଇ.ସି. କିମ୍ବା ୧ ମି.ଲି. ସ୍ଥାଇରୋମେସିଫେନ୍ ୨୨.୯% ଏସ୍.ସି. ମିଶାଇ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ଘୋଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ବିନ୍ / ଶିମ୍

- ଏହି ଫସଲରେ ଘୋଡ଼ା ପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୪ ମି.ଲି ଫୁବେଣ୍ଡିଆମାଇଡ଼୩୯.୩୫% ଏସ୍.ସି. ମିଶାଇ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ମିଶ୍ରଣ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ସର୍କୋଷ୍ଟୋରା ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ଡାଇଫେନୋକୋନାଜୋଲ୍ ୨୫% ଇ.ସି. କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୧୨% + ମାନକୋଜେବ୍ ୬୩% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ମିଶାଇ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ମିଶ୍ରଣ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଫୁଲ ଜାତୀୟ ଫସଲ

ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ

- ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛରେ ନାଲିବୁଡିଆଣୀ (ଅଷ୍ଟପଦୀ) ର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 1 କିଗ୍ରା ସଲଫର ସେଚିଡ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା 600 ମିଲି ଡାଇକୋଫଲ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ସଂବାଳୁଆ ଜାତୀୟ କଢ଼ଖୁଆ ପୋକକୁ ଦମନ କରିବାପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି ଏଣ୍ଡୋସଲଫାନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯେପରି କାଣ୍ଡ, ଫୁଲ, ପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜି ଔଷଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ତଳକୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ଖସିବ ।
- ଆଗରୁ ଖରାଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ତଳିପକାଇନଥିଲେ ତଳି ପକାନ୍ତୁ ।
- ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କମଳା ରଙ୍ଗର ସିରାକୋଲା କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ତଳିଘରାରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 5 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ବିହନକୁ 1 ସେମି ଗଭୀରରେ ବୁଣନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରାରୁ ରକ୍ଷାପାଇବାପାଇଁ ତଳିଘରାରେ ନଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଏକରକୁ 350 ରୁ 400 ଗ୍ରାମ୍ ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ।

ରଜନୀଗନ୍ଧା

- ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫେବୃଆରୀରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଯାଏ । କୋଲକାତା ସିଙ୍ଗଲ୍, ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର, କୋଏମ୍ବାର୍ ଟୁର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଓ ସୁହାସିନି (ଡବଲ୍) ଆଦି କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦିତ ସାରର (ଏକର ପ୍ରତି 80 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 80 କିଗ୍ରା ଫସଫରସ ଓ 80 କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାର) ର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ସବୁତକ ଫସଫରସ ଓ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 40,000 କନ୍ଦା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । କନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ 2.5 ସେମି ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ 4-5 କିଗ୍ରା ସେଲସିଅସରେ ରହିଥିବା କନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଗଜା ହୋଇଥାଏ ।
- ସୂତ୍ରଜୀବପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି 160 କିଗ୍ରା ନିମ୍ନପିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- କନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚେରଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ । ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 30 ସେମି କନ୍ଦାକୁ କନ୍ଦାକୁ 30 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଗୋଲାପ

- ଅଷ୍ଟପଦୀ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ଫେନପାଇରୋକ୍ସିମେଟ୍ ୫% ଇ.ସି. କିମ୍ବା ୨ ମି.ଲି. ପ୍ରୋପାରିଜାକର୍ ୫୭% ଇ.ସି. ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଗସଭା ଓ କଳାଦାଗ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି ଫେନକୋନାଜୋଲ୍ ୧୦% ଇ.ସି. କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୨୫% ଇ.ସି. କିମ୍ବା ୧ ମି.ଲି. ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ୨୫.୯% ଇ.ସି. କିମ୍ବା ୪ ଗ୍ରାମ୍ ସଲଫର୍ ୮୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ମିଶାଇ ମିଶ୍ରଣ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ସେବତୀ

- ସେବତୀ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୂଳରେ ପୁଆ ବାହାରିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୁଲ ସରିବା ପରେ ବାହାରୁଥିବା ପୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଆ ଗଛ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ।
- ସେବତୀରେ ଜଉପୋକ ଦେଖାଦେଲେ, ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400ମିଲି ମେଟାସିଷ୍ଟକ୍ସ କିମ୍ବା ଡାଇମେଥୋଏବ୍ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଫଳ ଜାତୀୟ ଫସଲ

ଆମ୍ବ

- ବଉଳ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଆମ୍ବ ତାଆଣୀ, ଆକ୍ସାକ୍ଲୋଜ୍ ଓ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆକ୍ସାକ୍ଲୋଜ୍ ଓ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ୍ ସଲ୍ଫର ସେଚିଡ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କାରାଥେନ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବ ତାଆଣୀର ଦମନ ପାଇଁ 2 ମିଲି ରୋଗର ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

କଦଳୀ

- କବକ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡି ପୋଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଳକୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ଗଛ ମୂଳରେ 5 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ପୁଡିଆ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ଶତକଡା 0.05 ଭାଗ ପ୍ରୋପିକୋନାଜଲ୍ ସହିତ କେତେ ବୁନ୍ଦା ଟିପଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- କଦଳୀରେ ଜଉପୋକ ଦେଖାଗଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲି ଡାଇମେଥୋଏବ୍ ପ୍ରତି ପତ୍ରକୋଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ସୁତ୍ରଜୀବ ହାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କଦଳୀ ଗଛ ଛୋଟ ହେବା ସହିତ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବି କମି ଯାଇଥାଏ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗଛ ମୂଳରେ 30 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବୋପୁରାନ୍ କିମ୍ବା 500 ଗ୍ରାମ୍ ନିମ ପିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ସିଗାଟୋକା ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 9 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୧୨% + ମାନକୋଜେବ୍ ୬୩% ଡବ୍ଲୁ.ପି. କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ୍ ୭୫% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଅମୃତଭଣ୍ଡା

- ଦହିଆ ପୋକ ଓ ଜଉପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୩ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍. କିମ୍ବା ୦.୩ ଗ୍ରାମ୍ ଥାୟୋମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ନଡିଆ

- ନଡିଆର ନାଲି ଘୁଣି ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଗଣ୍ଡିରେ ହୋଇଥିବା କଣାରେ କାର୍ବୋପୁରାନ୍ ୩% ଜି. + ବାଲି ୧:୧ ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ କଣାକୁ ମୁଦି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଗଣ୍ଡାପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ନଡିଆ ବଗିଚା ପାଖରେ ଥିବା ଖତଗଦାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଓ କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ୧.୫% ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

ଲେମ୍ବୁ

- ଲେମ୍ବୁ ରେ ପୁନିଜ ବେଳେ ଡାଇବ୍ୟାକ୍ ରୋଗ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ କଟା ସ୍ଥାନରେ ବୋରଡେକ୍ସ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକର ପ୍ରତି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ 400 ମିଲି ଲିଟର ଡାଇମେଥୋଏବ୍ କିମ୍ବା ମିଥାଇଲ ଡିନେଟ୍ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଆମ୍ବ

- ବଉଳ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଆମ୍ବ ତାଆଣୀ, ଆକ୍ସାକ୍ଲୋଜ୍ ଓ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆକ୍ସାକ୍ଲୋଜ୍ ଓ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ୍ ସଲ୍ଫର ସେଚିଡ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କାରାଥେନ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବ ତାଆଣୀର ଦମନ ପାଇଁ 2 ମିଲି ରୋଗର ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମହୁ ଚାଷ

- ❖ ମହୁମାଛି ପାଳନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଓ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ 15 ରୁ 20 ଟି ବାସ୍ତୁ ରଖିବା ଦରକାର । 2ଟି ବା 3ଟି ବାସ୍ତୁରେ ମହୁମାଛି ରଖିଲେ ନିଜର ଦରକାର ମୃତାବକ ମହୁ ମିଲି ପ୍ରାୟ 1000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମହୁବାସ୍ତୁ, କୁଇନ୍ ଗେଟ୍, ସ୍ଲୋକ ବା ଧୂଆଁ ଦେବା ଯନ୍ତ୍ର, ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର, ଓ ପ୍ରେମ୍ ଆଦି ଜିନିଷ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ।
- ❖ ମହୁଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସାତଫେଣିଆ ମାଛିକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ।
- ❖ ମହୁମାଛି ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ସକ୍ରୀୟ ରହନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଗୋଲାପ, ଜିନିଆ, ସେବଡି,ଗେଣ୍ଡୁ ଆଦି ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବାରୁ ମହୁମାଛି ମାନେ ସହଜରେ ମହୁ ଓ ରେଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଆନ୍ତି ।
- ❖ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ବାସ୍ତୁ ଫିଟାଇ ଫେଣା ସହ ପ୍ରେମ୍ କୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ । ଲାଗିଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଫେଣାକୁ କାଟି ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ।

- ❖ ବାଙ୍କର ଉପରି ଭାଗକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ । ବାଙ୍କର ଭିତର ବାହାର ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଓ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଧୂଆଁ ନବାଜିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ସମ୍ପଦ

- ଗୋଷାଦ୍ୟ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜୋଲା ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତି ଆଜୋଲା ପିଚ୍ ପାଇଁ 2 ମିଟର ଲମ୍ବା, 2 ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ଆଜୋଲା ଚାଷ କରିଥିଲେ ପ୍ରତି ପିଚ୍ ରୁ ଦୈନିକ ଅଧାକେଜି ରୁ ଏକ କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜୋଲା ଅମଳ କରି ଗାଇଗୋରୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ନଡ଼ାର ସୁବିଧା ଥିଲେ ପିଡିଆ ମିଶ୍ରିତ ନଡ଼ା ଉପଚାର କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ହେଲା ଯୁରିଆ 4 କେଜି, ପାଣି 50 ଲିଟର, ଓ ନଡ଼ା 100 କେଜି ।
- ପିଡିଆମିଶ୍ରିତ ନଡ଼ା ଉପଚାରକୁ ଗର୍ଭ ଗାଇ ଓ ବାଛରୀକୁ ଛାଜି ପିଡିଆ ଗାଇ ଓ ଦୁଧାଳୀ ଗାଇକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଗାଇ ବା ଛତା ଗରମ ଆସିବାର 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 15 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାନ୍ତୁ ।

ଗୋଷାଦ୍ୟ ଘାସ ମକା

- ❖ ରବି ରତ୍ନରେ ଗୋଷାଦ୍ୟ ମକା ପାଇଁ ଜଳସେଚିତ ଢିପ ଜମି ଓ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଚଲ୍ କିମ୍ବା ଜେ-100କିସମକୁ ଲଗାନ୍ତୁ । କିସମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକର ପ୍ରତି ଗ୍ରା ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କି 10 । ଜମିକୁ ଭଲଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତି ଚନ୍ ସଜା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ବିହନ ବୁଣିବାର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ ଭଲଭାବେ ଖରାରେ ସୁଖାଇ ଓ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରି ବୁଣନ୍ତୁ 7 । 3 ଗ୍ରା ବିହନକୁ କି 1 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ମିଶାଇ ବିହନ 1.5 ମ୍ ଥିରାମ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରା ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ସାତ ଦିନ ପରେ ପ୍ରତି କିମ୍ ଗ୍ରା 20 ଗ୍ରା ଦିନକୁ ହିସାବରେ ଆଜୋସିରିଲମ୍ ବିହନରେ ଗୋଳାଇ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବିହନକୁ ଧାଡିରେ ବୁଣନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ

- ଏକ ଏକର ଆୟତନର ପୋଖରୀରେ ପ୍ରତି ମିଟର ଗଭୀର ପାଣିରେ 80 କିଗ୍ରା ତୁନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ବିଶେଷ ଦ୍ରବ୍ୟ

- କୃଷି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିନା ଦେୟରେ କିଷାନ୍ କଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରର 1551 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।
- ଫସଲ ବୀମା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କରନ୍ତୁ ।

ଅନୁପମା ବଳିୟାରସିଂହ
ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର,
ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, ଓ.ୟୁ.ଏ.ଟି

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ,
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷିୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ