



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 03-02-2023

ଅଙ୍ଗୁଳ(ଓଡ଼ିଶା) - :2023-02-03 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2023-02-04	2023-02-05	2023-02-06	2023-02-07	2023-02-08
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	32.0	32.0	33.0	33.0	33.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	13.0	13.0	14.0	14.0	15.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	27	29	37	31	33
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	9	10	12	13	13
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	4.6	4.9	4.5	5.7	6.5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	236	255	214	259	279
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ଦ (ଅଙ୍କ)	1	0	0	0	0

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକତମ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଘୁଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୨-୩୩°C ଏବଂ ୧୩-୧୫°C ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ୪.୬-୬.୫ କି.ମି/ ଘ ବେଗରେ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା ମୁଖ୍ୟତଃ ୨୭-୩୩% ଏବଂ ୯-୧୩% ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଷ୍ଣୁରିତ ପରିସର ସୁତନା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ୧୨ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣରୁ ୨-୪°C କମ ରହିବ ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଟମାଟୋ ଫସଲରେ ପତ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତକ ପୋକ ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ Cyromazine 75% WP ୨୦୦ ଗ୍ରାମ/ha ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ବିରି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସଲଫର 80% W.P 4 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ମୁଗ	ବର୍ତ୍ତମାନ ର ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ହେତୁ ମୁଗ ଫସଲରେ ସାହେବି ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ଆକାଂକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯିବ । ଏକର ପ୍ରତି 20-ଟି ହଳଦିଆ ଆଠାଳିଆ ଯନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ । ରୋଗ ର ବାହକ ଧଳା ମାଛି ର ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 40-ଗ୍ରାମ ଅୟୋମେଥୋକ୍ସିମ ନାମକ କୀଟନାଶକ ବା 50-ଗ୍ରାମ ଅସିଡାମିପ୍ରୋଡ ନାମକ କୀଟନାଶକ -200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବାଇଗଣ	ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ରାତି ର କାକର କାରଣ ରୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଭିଷ୍ଟିନ ୩୦ ଗ୍ରାମ +Streptocyclin ୬ଗ୍ରାମ ୧୫ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ କିଆରୀ ରେ ପାଣି ମଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଗାଈ	ଗାଈ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଫାଟୁଆ ନହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୬ ମାସ ରେ ଥରେ ଟୀକା କାରଣ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ରେ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଟୀକା କାରଣ କରନ୍ତୁ

ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ	ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କମନ ଫାସହ	ମାଛ ମାନଙ୍କର ରୋଗ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଜଳ ର ଗୁଣବତ୍ତା କୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥି ପାଇଁ ପାଣି ର ପି.ଏଚ୍-୭.୫ ରୁ ୮.୫, ଦ୍ରାବିଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ-୫.୦ ppm , ତାପମାତ୍ରା- ୨୫-୩୦°C ଏବଂ କ୍ଷାରତା-୭୫-୧୭୫ ppm ଏବଂ ଭାରି ଜଳୀୟତା -୭୫-୧୫୦ ରହିବ ଆବଶ୍ୟକ। ୨ମାଣ ରୁ ପ୍ରଜନନ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ୩-୫ ମିଲି ମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ CIFABROOD ପ୍ୟାଲେଟ କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଆଁଳା ର ଓଜନ ର ଶତକଡ଼ା ୩-୫ ଭାଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।