



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା**  
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



# କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 03-02-2023

ରାୟଗଡ଼(ଓଡ଼ିଶା) - :2023-02-03 ( ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

| ପାଣିପାଗ କାରକ                    | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ବର୍ଷା (ମିମି)                    | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)  | 30.0       | 30.0       | 30.0       | 31.0       | 31.0       |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍) | 15.0       | 15.0       | 15.0       | 16.0       | 16.0       |
| ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)   | 46         | 56         | 59         | 45         | 51         |
| ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)  | 9          | 8          | 10         | 11         | 11         |
| ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)     | 5.3        | 5.2        | 4.7        | 5.4        | 6.1        |
| ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)               | 158        | 158        | 158        | 202        | 202        |
| ମେଘାଚ୍ଛନ୍ଦ (ଅଙ୍କ)               | 2          | 1          | 0          | 0          | 0          |

**ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:**

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 30.0 ° C-31.0 ° C ରହିବ । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15.0 ° C-16.0 ° C ରହିବ । ପବନର ବେଗ 4.7-6.1 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ପୂର୍ବାହ୍ନ (45-59%) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ (9-11%) ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇପାରେ ।

**ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:**

ଲଙ୍କା ରେ ପତ୍ର ଖାଉଥିବା ଶିଶୁମୁଖୀ ଏବଂ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ରେ 0.5 ଗ୍ରାମ ଏମାମେକ୍ସିନ୍ ବେନଜୋଏଟ୍ କିମ୍ବା 0.4 ମିଲି ସ୍ପିନୋସାଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

**ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:**

ଫେବୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ଚରଭୁଜ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସମୟ ।

**ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

| ଶସ୍ୟ  | ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ |
|---|------------------------------|
| ମହିଷାରୋଗ: ବିଷ୍ଣୋରଣ: କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ 50% WP @ 1.5g / ଲିଟରକିମ୍ବାହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ 4% WP + ଜିନେବ 6.8% WP @ 2.0 g / ଲିଟରକିମ୍ବାତ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ 18% + ମାନକୋଜେବ 62% WP @ 2.0g / ଲିଟରକିମ୍ବାଏଡିଫେନଫୋସ 50% EC @ 1.0 ମିଲି / ଲିଟରସିଂଚନକରନ୍ତୁ |                              |

**ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

| ଉଦ୍ୟାନକୃଷି | ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ   |
|------------|--|
| ଚମାଟର      | ଚମାଟର ରେ ପତ୍ର ଖାଉ ଥିବା ଶିଶୁମୁଖୀ ଏବଂ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ରେ 0.5 ଗ୍ରାମ ଏମାମେକ୍ସିନ୍ ବେନଜୋଏଟ୍ କିମ୍ବା 0.4 ମିଲି ସ୍ପିନୋସାଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । |

| ଉଦ୍ୟାନକୃଷି | ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ  |
|------------|---|
| ଭେଣ୍ଟି     | ଭେଣ୍ଟି ଫଳ ବିନ୍ଧା ଏବଂ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା 200 ଲିଟର ପାଣିରେ 70 ମିଲି ସ୍ପିନୋସାଡ଼ କିମ୍ବା 60gm ଆମୋନିୟମ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।  |
| ବାଇଗଣ      | ବାଇଗଣ ର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ 1500ppm @ 600ml / ଏକରସ୍ତେ କରନ୍ତୁ । ପରେ 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ସ୍ପିନୋସାଡ଼ 45% SC @ 70ml / ଏକର ଏବଂ ଥିଓଡ଼ିକାର୍ବ @ 300g / ଏକର ର ବିକଳ୍ପ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ । |